

AMDCS recommandation H Prothèse partielle + Capacité de mastication

Etat: janvier 2010

PROTHESE PARTIELLE, FONCTION + FACULTE DE MASTICATION

Pour simplifier la lecture du texte ci-dessous, nous utilisons la forme masculine ou féminine déterminante dans la profession; cela inclut à chaque fois automatiquement l'autre forme féminine ou masculine.

Environnement, évidence

Suivant la situation du traitement, la bonne ou mauvaise collaboration du patient et le pronostic général sur le reste de la dentition, la planification d'une prothèse partielle peut varier considérablement. La réalisation technique et l'environnement dans lequel évolue le patient permettent de déterminer assez précisément la durée probable du maintien d'une prothèse partielle. Il n'est donc pas utile de planifier une prothèse partielle onéreuse sur un reste de dentition bénéficiant d'une préparation minimale. A une durée probable d'usage, il faut mettre en corrélation les données de traitements correspondantes pour la préparation des crochets et un niveau d'assainissement des autres dents qui doivent être traitées sur la même arcade.

Indications de traitement

- **Indication fonctionnelle**
Impossibilité de mastiquer après la perte d'une dent sans adaptation fonctionnelle et avec moins de 10 paires de dents antagonistes.
- **Indication esthétique**
Perte de dents antérieures, y compris les dents 14 24 pendant la planification en cours ou durant les 18 derniers mois.

Variantes de planification

Dans le cadre de la médecine sociale, les variantes de planification suivantes sont possibles:

- i **Pas de traitement, laisser les espaces**
- i **Prothèse avec crochets en fil d'acier au maxillaire supérieur / pos. tarif. 4610** (durée d'usage de 24 mois) ou „prothèse résine“ pour un remplacement esthétique lorsqu'il manque des dents isolées (MS-dents antérieures 14 à 24)
- i **Prothèse partielle en résine avec crochets en fil d'acier aux maxillaire supérieur et inférieur / avec des crochets plus grands à la mandibule/ pos. tarif. 4611** (durée estimée d'usage 2 à 8 ans)
- i **Prothèse à châssis coulé / pos. tarif. 4612** (durée estimée d'usage 5 à 15 ans, solution définitive) (n'est autorisée pour les PC et l'AS qu'avec une attestation de collaboration portant sur les 18 derniers mois)

(Une prothèse hybride / pos. tarif. 4615 ne peut pas être autorisée en médecine sociale)

Documents de planification

Le dentiste-traitant doit transmettre aux services sociaux:

- i Une attestation avec l'indication de traitement ou l'impossibilité de mastiquer,
- i une planification détaillée avec le devis ainsi que le devis détaillé des frais de laboratoire (tarif LAA), suivant les données de traitement fournies,
- i et en plus, pour les prothèses à châssis coulé 4612 :
un orthopantomogramme ou, sinon, un schéma dentaire avec l'examen des poches et les radios apicales des dents supportant les crochets et description de la reconstruction.
Attestation de collaboration: attestation d'une collaboration active (positive) du patient concernant l'hygiène buccale et de sa disponibilité pour un système de rappels dans le même cabinet du médecin-dentiste traitant ou de la même clinique

Facturation

Médecin-dentiste: au tarif de médecin-dentiste de l'assurance-sociale („Tarif-AS“, ancien "tarif-Suva“)

Prestations de technique dentaire: ce sont des dispositifs sur mesure au sens de la législation sur les dispositifs médicaux, pour lesquelles le médecin-dentiste traitant est responsable. Par conséquent, le médecin-dentiste traitant assume les frais de technique dentaire, les paie, les préfinance et les ajoute à ses propres frais de traitement, sans supplément.

Dès le 1^{er} janvier 2010, le tarif de technicien dentaire s'applique, selon la liste de concordance PC+ AS (colonne verte) et avec une valeur de point de Fr. 1.00 (sous réserve d'une adaptation ultérieure à la valeur du point LAA).

Dans le canton de Vaud, le tarif de laboratoire à Fr. 1.00 le point ne s'applique que pour les dossiers traités via MEDIDENT.

Éléments de planification de médecine sociale dans le domaine „prothèse partielle“

4610: Prothèse avec crochets en fil d'acier au maxillaire supérieur

Indication (seulement maxillaire supérieur): Impossibilité de mastiquer après la perte des dents sans adaptation fonctionnelle et avec moins de 10 paires d'antagonistes fonctionnelles ou indication esthétique en cas de perte de dents antérieures, y compris 14 à 24, pendant la planification en cours ou pendant les 18 derniers mois.

Durée d'usage: jusqu'à 24 mois.

Selon le domaine social, les éléments suivants s'appliquent:

Domaine de l'asile	cas normal, solution sur le long terme
PC, aide sociale	Cas normal, avec mauvaise collaboration, patients dépendants de la drogue sans attestation de collaboration Exception: solution provisoire jusqu'à la stabilisation, (p. ex. après un accident), prothèse reconstructive

Etendue des prestations, critères techniques:

selon le tarif de médecin-dentiste: planification, moulage, moulage des antagonistes, détermination de la dimension verticale, choix de la forme et de la couleur, mise en bouche, instruction sur la manipulation; un enregistrement d'occlusion ne peut être pris en compte que pour des modèles qu'on ne peut pas utiliser.

Empreinte: Empreinte alginate avec fourchette confectionnée, pas d'empreinte avec une fourchette individuelle

Prise d'occlusion: év. simple prise d'occlusion manuelle, en tout cas un chablon en cire

Préparation des crochets: Obturation en ciment (GIC, compomer), dans un cas normal **aucun** traitement endodontique, une simple endodontie est indiquée uniquement pour des dents stratégiquement importantes / pour des canines

Traitement préalable d'autres dents avec besoin urgent de traitement sur la même arcade:

- en principe, extraction,
- en cas de perte de substance molle jusqu'à max. 50%, traitement endodontique le plus simple (amputation de la pulpe chez les adultes avec N2), mettre la dent en sous-occlusion et obturation en amalgame ou composite.

Facturation:	médecin-dentiste:	Position tarifaire 4610	
	Technique dentaire:	Enveloppe des coûts, y c. TVA	Fr. 700 - 900

(4610): „Prothèse provisoire résine“ (position tarifaire analogue)

(voir à ce propos l'exemple illustré sur www.kantonszahnärzte.ch)

Indication (seulement au maxillaire supérieur): dent antérieure manquante isolée au maxillaire supérieur, y compris 14 24

Durée d'usage: au moins 24 mois

Selon le domaine social, les éléments suivants s'appliquent:

Domaine de l'asile	peut être autorisé dans des cas exceptionnels
PC, aide sociale	dents 321+123 solution provisoire jusqu'à l'implantation définitive ou cas normal en présence d'une mauvaise collaboration du patient, patient dépendant de la drogue sans attestation de collaboration dent 4+ ou +4 comme solution définitive, si la fonction est garantie

Etendue des prestations, critères techniques:

Planification, moulage, moulages antagonistes, choix de la forme et de la couleur, mise en bouche, instruction sur la manipulation; une prise d'occlusion ne peut être prise en compte que pour des modèles qu'on ne peut pas reprendre.

Empreinte: Empreinte alginate, empreinte en silicone avec fourchette confectionnée, pas d'empreinte avec fourchette indiv.

Prise d'occlusion: év. simple prise d'occlusion manuelle, en tout cas un chablon en cire

Préparation des dents voisines: Obturation en ciment (GIC, compomer), pour les solutions définitives obturation composite, les traitements endodontiques doivent être spécialement motivés

Traitement préalable d'autres dents avec besoin urgent de traitement sur la même arcade selon planification spéciale / recherche de coût / autorisation de prise en charge

Facturation:	médecin-dentiste:	Position tarifaire 4610 (analogue)	
	Technique dentaire:	Enveloppe des coûts, y c. TVA	Fr. 450 (1 dent) à Fr. 650 (bilatéral)

4611: Prothèse partielle résine avec crochets en fil d'acier aux maxillaires inférieurs et supérieurs / avec crochets coulés au maxillaire inférieur

Indication: impossibilité de mastiquer après perte d'une dent sans adaptation fonctionnelle et moins de 10 paires de dents antagonistes fonctionnelles ou indication esthétique après perte de dents antérieures, durant la planification actuelle ou pendant les dix-huit derniers mois.

Si à la mâchoire inférieure, seules les canines sont encore présentes, il est possible de choisir exceptionnellement une construction avec deux crochets coulés (préparer le support) dans une empreinte individuelle avec châssis. Pour les crochets en fil d'acier à la mâchoire inférieure, il faut choisir un châssis préfabriqué

Durée d'usage probable: 2 à 8 ans

Selon le domaine social, les éléments suivants s'appliquent:

Domaine de l'asile cas exceptionnel (demande motivée), patient en passe de devenir réfugié
PC, aide sociale, (réf.) compromis en présence d'une mauvaise collaboration

Etendue des prestations, critères techniques:

selon le tarif dentaire : planification, explications au patient, premier moulage, moulage maxillaire antagoniste, détermination de la dimension verticale, choix de la forme et de la couleur, mise en bouche, instruction de manipulation, instruction sur l'hygiène

Empreinte: normalement, empreinte en silicone / polyéther sans prise porte-empreinte individuel.

Prise d'occlusion: simple prise d'occlusion manuelle, en tout cas un chablon en cire

Construction: au max. 4 crochets en fil d'acier (MS/MI), au max. 2 crochets coulés dans un porte-empreinte individuel avec liant (MI)

Préparation des crochets: Obturation de ciment (GIC, compomer), **pas de** traitement endodontique

Traitement préalable d'autres dents avec besoin urgent de traitement sur la même arcade:

- en principe, extraction,
- en cas de perte de substance molle jusqu'à max. 50%, traitement endodontique le plus simple (amputation de la pulpe chez les adultes avec N2), mettre la dent en sous occlusion et obturation en amalgame ou composite.

Facturation: Médecin-dentiste: Position tarifaire 4611
Technique dentaire: **MS/MI: max. quatre** crochets en fil d'acier, devis y c. TVA Fr. 700 à 900
MI max. deux crochets coulé dans un porte-empreinte individuel avec le grand liant enveloppe des coûts, TVA comprise Fr. 1'100 à 1'400

4612: Prothèse à châssis coulé

Indication (maxillaire et inférieur): impossibilité de mastiquer après perte d'une dent sans adaptation fonctionnelle et moins de 10 paires de dents antagonistes fonctionnelles ou indication esthétique après perte de plusieurs dents antérieures, y compris 14 24, durant la planification actuelle ou pendant les dix-huit derniers mois.

Durée d'usage probable: 5 à 15 ans

Selon le domaine social, les éléments suivants s'appliquent:

Domaine de l'asile ne peut pas être autorisé

PC, aide sociale cas normal (collaboration active du patient et rappel doivent être assurés)

Attestation de collaboration: (PC) Attestation d'une collaboration active (positive) du patient, brève attestation de prophylaxie et de rappel

(p. ex. „Monsieur X.Y. bénéficie depuis 5 ans de contrôles dentaires et de traitement d'hygiène dentaire. Il présente une bonne hygiène buccale.“)

(AS) Attestation d'une collaboration active (positive) du patient concernant l'hygiène buccale et de trois rendez-vous au moins durant les 18 derniers mois suivis pour des rappels d'hygiène dentaire dans le cabinet ou la clinique qui planifie / réalise le traitement.

(ex. „J'ai contrôlé personnellement trois fois l'hygiène buccale de Monsieur X.Y. durant les deux dernières années. Monsieur X.Y. a compris qu'une bonne hygiène buccale était déterminante pour une bonne santé orale et du reste de ses dents ou pour garantir un usage durable de sa prothèse métallique coulée. Je peux lui attester une très bonne collaboration et une bonne hygiène buccale.“)

Il faut souligner qu'en présence de fausses attestations ou d'attestations de complaisance (concernant l'indication de traitement ou la collaboration) la police sanitaire ou l'autorité de surveillance peut prononcer des sanctions (p. ex. avertissements, exclusion de la médecine dentaire sociale, etc.).

Etendue des prestations, critères techniques:

selon le tarif dentaire: planification, explications au patient, modèle d'étude, empreinte maxillaire antagoniste détermination de la dimension verticale, choix de la forme et de la couleur, planification de l'armature sur le modèle, planification de l'armature parallèle, description de la construction, montage, crochets, essai d'armature, mise en bouche, instruction sur la manipulation, instruction d'hygiène.

Empreinte: Empreinte définitive avec porte-empreinte individuel (4631) obligatoire

Les empreintes compressives **ne peuvent pas** être facturées

Prise d'occlusion: en fonction de la situation et „lege artis“

